

***Chiamate il pediatra di base o il servizio vaccinale se:***

- il bambino ha una temperatura corporea superiore a 40,5° rettali
- il bambino appare molto pallido e debole
- il bambino ha pianto ininterrottamente per più di tre ore e non siete riusciti a calmarlo oppure ha pianto in modo anormale
- il bambino ha manifestato tremori, contrazioni o scatti improvvisi

*A chi rivolgersi  
per ulteriori informazioni*

***DISTRETTI:***

***SASSARI tel. 0792062874  
ALGHERO tel. 0799731022  
OZIERI tel. 079779319***



REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA  
***AZIENDA UNITA'  
SANITARIA LOCALE N° 1  
SASSARI***  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
***SERVIZIO IGIENE E  
SANITA' PUBBLICA***



***Qualche  
consiglio  
utile.....  
...se dopo la  
vaccinazione il tuo bimbo  
manifesta qualche  
comportamento insolito***

Dopo la vaccinazione il bimbo può manifestare, anche se raramente, qualche breve e transitorio comportamento insolito.

In questo opuscolo informativo riportiamo le risposte alle domande più frequenti; se avete altri dubbi o desiderate altre informazioni chiamate il pediatra di base o il servizio vaccinazioni.

◆ ***Dopo la vaccinazione il mio bambino è irrequieto, che cosa devo fare?***

Dopo la vaccinazione i bambini possono apparire particolarmente irrequieti poiché possono sentire dolore nella sede dell'iniezione o avere la febbre. Si può somministrare loro un farmaco, il "paracetamolo", che aiuta a ridurre il dolore e la febbre: tale sostanza si trova in commercio con il nome di Tachipirina, Efferalgan, ecc.; si utilizza il dosaggio previsto per il peso e l'età del bambino.

Se lo stato di irrequietezza persiste per più di 24 ore consultare il pediatra di base o il servizio vaccinale.

◆ ***La gamba (o il braccio) del mio bambino è calda, gonfia e arrossata. Che cosa devo fare?***

Per alleviare il fastidio è sufficiente applicare un panno pulito e fresco sulla zona dolorosa ed infiammata, se ritenete che il bambino abbia molto dolore poiché reagisce alla minima pressione potete somministrare il paracetamolo.

Se dopo 24 ore il rossore tende ancora ad aumentare chiamate il pediatra di base o il servizio vaccinale.

◆ ***Penso che il bambino abbia la febbre, che cosa devo fare?***

Prima di tutto verificate se l'impressione è corretta e misurate la temperatura del bambino. È consigliabile misurare la temperatura rettale perché più attendibile.



◆ ***Se il bambino ha la febbre:***

- dategli da bere in abbondanza
- vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente
- fategli un bagno in acqua tiepida (non fredda)
- somministrate paracetamolo se la febbre supera i 39° C rettali

Se la febbre persiste e tende ad aumentare consultare il pediatra di fiducia

