


ASSL LANUSEI- Malattia meningococcica



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

ADOLESCENTI E MALATTIA MENINGOCOCCICA:

gestire un rischio prevenibile


Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 prevede l'offerta gratuita della vaccinazione antimeningococcica tetravalente contro i ceppi A, C, Y, W135, negli adolescenti di età compresa tra 12 - 18 anni di età.

La meningite

CHE COS'È

È una infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale (meningi)

LE CAUSE PIÙ COMUNI



SINTOMI

Soggettivi
Cefalea, mialgia, fotofobia, vomito

Obiettivi
Febbre elevata, alterazioni di coscienza, rigidità nucale, crisi convulsive

TERAPIA

Meningite virale
Antipiretici e analgesici (di solito non ha conseguenze e si guarisce in una decina di giorni)

Meningite batterica
Antibiotici

LETALITÀ DELLA FORMA BATTERICA



ANSA Centimetri

ASSL LANUSEI- Malattia meningococcica

Del meningococco esistono diversi sierogruppi, dei quali i più diffusi sono: A, B, C, Y, W135.

La malattia meningococcica è una delle malattie infettive più temute dai medici, rappresenta una grave minaccia per la salute, è di difficile diagnosi nella sua fase iniziale, può portare a morte nell'arco di poche ore; anche dopo la diagnosi e la terapia, le infezioni da meningococco possono essere causa di gravi disabilità permanenti.

Come si trasmette

Il contagio da un individuo all'altro avviene per via diretta attraverso le microscopiche gocce di saliva emesse con la tosse, gli starnuti o respirando vicinissimi. Il meningococco riesce a sopravvivere per un breve tempo nell'ambiente; quindi il contatto deve essere molto ravvicinato.



L'INCUBAZIONE DELLA MALATTIA

Incubazione o prodromi

INCUBAZIONE

Il periodo è di almeno 3-4 giorni

L'ESORDIO SINTOMI

Sintomi brevi

- Febbre
- Faticagli
- Capoggetti

Sintomi di meningite

- Rigidità del collo
- Fotofobia
- Mal di testa
- Macchie sulla pelle



Come si manifesta

PRIMO DELLA MALATTIA

Di solito il periodo di incubazione è di almeno tre o quattro giorni



SINTOMI

I sintomi iniziano da semplice infezioni delle prime vie respiratorie (tosse, faringiti e congiuntivite) o febbri ricorrenti associate a testate



MEINGITE MENINGOCOCCICA

È l'infiammazione delle meningi, le membrane che ricoprono il cervello. Rappresenta il 35% di tutte le meningiti totali anche del bambino.



COMPLICANZE

Nei 10% dei casi è mortale. Dopo la guarigione, possono restare punture come sordità, paralisi nei nervi cranici o deficit motori.



SEPSI MENINGOCOCCICA

La sepsi (o setticemia) è l'invasione da parte del meningococco di tutti gli organi attraverso il sangue. La mortalità è del 75%.



Fonte: Quasipano

ASSL LANUSEI- Malattia meningococcica

Gli adolescenti e i giovani sono maggiormente a rischio di contrarre l'infezione perché spesso adottano comportamenti che implicano uno stretto contatto interpersonale e dunque, il rischio di contagio aumenta in comunità chiuse ed affollate quali: scuole, campi estivi, collegi, discoteche, caserme militari, centri di accoglienza, ecc.

La malattia meningococcica può essere controllata grazie all'attuazione di appropriate strategie di vaccinazione e soprattutto da una vaccinazione precoce (PNPV 2017-2019).

Nella ASL di Lanusei, è stata attivata una Campagna di Vaccinazione, con chiamata attiva degli adolescenti nati nel 2000 e nel 2006 e che proseguirà nel corso del 2018, con l'offerta attiva del vaccino antimeningite quadrivalente a tutti gli adolescenti di età compresa tra 12 - 18 anni.

La vaccinazione nei confronti del meningococco A, C, Y, W135 nell'adolescente, può essere somministrata sia come richiamo, per chi è già stato vaccinato da piccolo con il meningococco C, sia per chi non è mai stato vaccinato.

Il vaccino contro il meningococco di tipo B, invece, è offerto gratuitamente ai nati nel 2017 e ad alcune categorie a rischio per patologia. Per tutte le altre persone è a pagamento e disponibile su prenotazione presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL.

*Per ulteriori informazioni sulla malattia e sulla vaccinazione rivolgersi al proprio Pediatra (PLS) o al Medico di famiglia (MMG) e agli **Ambulatori** del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL, dove sarà praticata la vaccinazione:*

Lanusei – Via Trento, tel. 0782 – 470455, 0782 - 470454;

Jerzu – Via A. Melis, 18 – tel. 0782 - 70177, 0782 – 708028;

Tortolì – Via Monsignor Virgilio, tel. 0782 – 624673.